

¿Qué se sabe sobre el fentanilo?

Es potente



El fentanilo es un opioide muy potente, **50 veces más potente** que la heroína.

Es de rápida acción



Se puede producir una sobredosis en cuestión de **segundos o minutos**.

Es de alto riesgo



Hoy en día, la mayoría de las muertes por sobredosis en el estado de Washington están relacionadas con el uso de fentanilo.

¿Qué aspecto tiene?

En el estado de Washington, el fentanilo se produce mayormente en forma de píldoras azules con un sello que contiene la leyenda "M30". A veces, se encuentra en drogas que se parecen a un polvo o a una piedra, como el crack de cocaína.



El fentanilo podría encontrarse en cualquier droga que se compra en la calle o en Internet. El aspecto del fentanilo cambiará constantemente.

¿Cuál es el riesgo?

La cantidad y la concentración de fentanilo **pueden variar bastante**.


Una píldora podría contener una cantidad letal.

Otra píldora podría contener muy poca cantidad de fentanilo, si es que tiene.



La naloxona revierte el efecto del fentanilo.

Tenga a mano naloxona. Dígalas a las personas que usted tiene naloxona y enséñeles a usarla. Como el fentanilo es tan potente, podría ser necesario usar más de una dosis de naloxona para revertir su efecto. Tenga siempre a mano kits adicionales de naloxona.



La metanfetamina no revierte una sobredosis.

De hecho, el uso de metanfetamina junto con fentanilo **aumenta las probabilidades de tener una sobredosis**.

Si usa metanfetamina y fentanilo, use uno a la vez, y aumente el consumo poco a poco en pequeñas cantidades.



Datos desmitificadores

1


Puede tener una sobredosis de fentanilo en cualquiera de sus formulaciones: ya sea que lo fume, lo trague, lo inhale o se lo inyecte.

2

Es prudente tomar medidas ante una sobredosis de fentanilo. No puede tener una sobredosis simplemente por tocar el fentanilo o las drogas que contienen fentanilo.

¿Qué puedo hacer?

- Comience con una **cantidad pequeña** y **auméntela poco a poco**. Use una droga a la vez.
- Cuando sea posible, consuma drogas **en compañía de otras personas**. Las drogas deben consumirse por turnos, solo una persona a la vez. De esta forma, si una tiene una sobredosis, otra persona del grupo podrá tomar las medidas necesarias.
- Si consume drogas estando solo, **cuénteselo a algún amigo para que esté atento**.



Use **neverusealone.com** (seleccione "Español") o llame al **(877) 696-1996**. Deberá compartir algunos datos básicos y el operador permanecerá en línea con usted durante algunos minutos después del consumo. Si usted deja de responder, el operador llamará al 911.

- **Controle su tolerancia.** Si deja de consumir fentanilo u otros opioides transitoriamente, al empezar de nuevo, use una cantidad mas pequeña.

Signos de sobredosis de fentanilo:

- No está respirando. Atragantamiento o ronquidos intensos.
- No poder despertarse.
- Piel, labios o uñas de los dedos de las manos de color azul o gris.
- Los músculos del pecho pueden ponerse rígidos.



Qué hacer en caso de sobredosis:

- **Llame al 911 de inmediato.** No debe decir que ha ocurrido una sobredosis, sino que hay una persona que no está respirando.
- **Administre una dosis de naloxona.** Es posible que deba administrar otra dosis cada 2 minutos. Dar respiración de rescate hasta que la persona comience a respirar por sí misma.



Obtenga más información sobre el fentanilo y dónde obtener naloxona en:
StopOverdose.org y LacedAndLethal.com (seleccione "Español")

STOPOVERDOSE
.org

**LACED &
LETHAL**